

HIV/sida dans l'Enquête Démographique et de Santé du Burundi de 2010

Au cours de l'Enquête Démographique et de Santé réalisée au Burundi en 2010, plus de 4 500 femmes de 15 à 49 ans et 4 000 hommes de 15 à 59 ans ont été testés pour le VIH. Les résultats montrent que 1,4 % des personnes de 15-49 ans sont infectées par le VIH.




La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Environ 2 % des femmes sont infectées contre seulement 1 % des hommes. La prévalence est beaucoup plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural (4,1 % contre 1,0 %).




En général, les femmes sont infectées plus précocement que les hommes. Les taux d'infection augmentent rapidement avec l'âge pour atteindre un maximum de 3,7 % à 35-39 ans pour les femmes et de 3,3 % à 40-44 ans pour les hommes.






C'est à Bujumbura Mairie que la prévalence du VIH est la plus élevée (3,7 %). Environs 6 % des femmes à Bujumbura Mairie sont séropositives. La prévalence du VIH est de 1,6 % ou moins dans les autres régions.

Prévalence du VIH selon le niveau d'instruction



La prévalence du VIH augmente avec le niveau d'instruction chez les femmes. Il n'y a pas d'association claire chez les hommes.


Prévalence du VIH selon le statut matrimonial



Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Les femmes et les hommes qui sont divorcés/séparés et les veuves ont les taux d'infection les plus élevés. Les célibataires ont un taux d'infection très bas.

Prévalence du VIH selon le niveau de bien-être économique du ménage



La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes et les hommes des ménages les plus riches.

Prévalence du VIH selon le nombre de partenaires sur la durée de vie


Nombre de partenaires sexuels	Femmes 15-49	Hommes 15-49
1	1,5	0,2
2	4,1	1,6
3-4	8,0	4,0
5-9	Trop peu de cas	4,9

La prévalence du VIH augmente avec le nombre de partenaires sexuels sur la durée de vie.

Parmi les couples vivant dans le même ménage et dont les deux conjoints ont été testés, 1 % est discordant, ce qui veut dire que seulement un des deux conjoints est séropositif.

Prévalence du VIH parmi les jeunes de 15-24 ans

Femmes 15-24 | Hommes 15-24 | Ensemble 15-24



Burundi Urbain Rural

La prévalence du VIH est plus de trois fois plus élevée parmi les jeunes vivant en milieu urbain (1,4 %) que les jeunes vivant en milieu rural (0,4 %).

Taux de réponse et méthodologie : *Les données sur la prévalence du VIH ont été obtenues à partir d'un échantillon de gouttes de sang séché, prélevées volontairement par piqûre au bout du doigt auprès des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans. Près de 92 % des femmes et 89 % des hommes ont été testés. Dans l'ensemble, 90 % des 9 503 enquêtés ont été testés.*

Pour tous renseignements concernant l'EDSB-II 2010, contacter :

Au Burundi:
l'Institut de Statistiques et d'Études Économiques du Burundi (ISTEEBU),
B.P. 1156, Bujumbura, Burundi ;
Téléphone : (257) 22 226 729/ 22 222 149
Fax : (257) 22 222 635,
E-mail : isteebu@cbinf.com;
www.isteebu.org

Aux États-Unis:
MEASURE DHS
ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone: 301-572-0200
Fax: 301-572-0999
www.measuredhs.com

L'Enquête Démographique et de Santé du Burundi 2010 (EDSB-II 2010) a été réalisée par l'Institut de Statistiques et d'Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU) et l'Institut National de Santé Publique (INSP). En plus du financement du Gouvernement du Burundi, cette enquête a été financée par le Département pour le Développement International (DFID) du Royaume Uni, l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), la Coopération Suisse, et le Fonds des Nations Unies pour les Activités de Population (UNFPA). ICF International a fourni l'assistance technique par le biais du programme MEASURE DHS, programme financé par l'USAID et dont l'objectif est de fournir un support et une assistance technique à des pays du monde entier pour la réalisation d'enquêtes sur la population et la santé.
















Enquête Démographique et de Santé Burundi 2010



Prévalence du VIH